

# AVERTISSEMENTS AGRICILES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43-09.27.46

ABONNEMENT ANNUEL

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN n° 13 - 22 Mai 1980

Abonnement annuel : 60 F.

## V I G N E

Brenner : Renouveler le traitement après les dernières pluies ou après une pousse de trois nouvelles feuilles, en zone sensible à cette maladie.

Oïdium : Ajouter un soufre mouillable à la bouillie anti-Brenner.

Araignées rouges : Les éclosions sont pratiquement terminées, il convient d'effectuer un traitement avec un acaricide spécifique (genre Benzoximate, Bromopropylate etc...); dans ces parcelles infestées (jeunes feuilles légèrement gaufrées, avec des dents brunes nécrosées).

Vers de la grappe (Cochylis et Eudemis) : Le premier vol est en cours, ne pas intervenir pour le moment, attendre un prochain avis pour les parcelles habituellement touchées par ces parasites.

Pyrale : En raison des sorties échelonnées des chenilles, prévoir un traitement visant ce parasite dans la semaine du 26 Mai.

## ARBORICULTURE FRUITIERE

Tavelure du pommier : Des feuilles tavelées, en très petit nombre, ont été remarquées dans quelques vergers habituellement bien traités. La protection des arbres doit se poursuivre, le stock d'ascospores n'étant pas épuisé.

Oïdium du pommier : De jeunes pousses totalement oïdiées sont visibles. Il est conseillé de couper et de brûler celles-ci autant que faire se peut et de continuer la protection.

Araignées rouges : L'éclosion des oeufs d'hiver est terminée. Dans certains vergers, la progression des acariciens a maintenant atteint les 2ème - 3ème feuilles des pousses; surveiller très attentivement les arbres et intervenir à l'aide d'un acaricide spécifique au plus tard fin mai, dans les vergers où les foyers sont présents et fréquents, traiter en fin de journée de préférence.

Hyponomeute du pommier sur arbres de plein vent : voir notre dernier avis du 16 mai. Les chenilles ont maintenant quitté leur mine foliaire; les premiers nids soyeux sont visibles. Il faut maintenant intervenir très rapidement pour éviter une défeuillaison totale des arbres en Juin.

Pucerons : à surveiller.

Monilia des cerisiers : Sur arbres où la maladie est présente, poursuivre la protection pour protéger les fruits très sensibles à la maladie.

Pucerons noirs sur cerisier : En présence de foyers de pucerons, intervenir à l'aide d'un aphicide endotherapique.

Le Chef de la Circonscription  
phytosanitaire CHAMPAGNE-ARDENNE,

J. DELATTRE